

IMPFSHEMA SCHWEINE/FERKEL

Circovirose (Ferkelimpfung)

Impfstoff: CircoFLEX → 1ml ab der 2. Lebenswoche

Impfstoff: Porcilis PCV → 2ml ab der 3. Lebenswoche

- Injektion: intramuskulär, hinter dem Ohr
- Impfschutz: 22 Wochen

Circovirose (Mutterschutzimpfung)

Impfstoff: Circovac

Sauen: Impfdosis 2ml

1. Injektion → 5-6 Wochen vor dem Abferkeln
2. Injektion → 3-4 Wochen später (min. 2 Wochen vor dem Abferkeln)

Remonten/Jungsauen: Impfdosis 2ml

1. Injektion → 5-6 Wochen vor dem Belegen
2. Injektion → 3-4 Wochen später (min. 2-3 Wochen vor dem Belegen)
3. Injektion → min. 2 Wochen vor dem Abferkeln

- Immunitätsdauer der Ferkel: bis zu 5 Wochen nach Aufnahme Kolostrum

Ferkel: Impfdosis 0.5ml

1 Impfung ab der 3. Lebenswoche

- Immunitätsdauer: min. 14 Wochen nach Impfung

Wiederholungsimpfungen → bei jeder Trächtigkeit eine Impfung, 2-3 Wochen vor dem abferkeln

Rotlauf und Parvovirose

Impfstoff: Parvoruvax

Impfdosis: 2ml intramuskulär hinter dem Ohr

1. Injektion → ab einem Alter von 6 Monaten
2. Injektion → 3-4 Wochen später (min. 2 Wochen vor dem Decken)

Wiederholungsimpfungen → alle 6 Monate

(Sauen: während jeder Laktation 1 Woche vor oder beim Absetzen)

HPS (Haemophilus parasuis)

Impfstoff ①: stallspezifische Vakzine → 4ml intramuskulär

Impfstoff ②: Porcilis Glässer → 2ml intramuskulär

Grundimmunisierung → 2 Impfungen im Abstand von 3-6 Wochen vor dem abferkeln
(2. Impfung min. 2 Wochen vor dem Abferkeln)

Wiederholungsimpfungen → bei jeder Trächtigkeit eine Impfung, 2-3 Wochen vor dem Abferkeln.

→ Bei starkem Infektionsdruck, müssen Ferkel/Jäger ab 25kg/KGW geimpft werden.

Coli-Durchfall

Impfstoff: Porcilis Porcoli DF

Impfdosis: 2ml intramuskulär vor dem Ohr

1. Injektion → 6-8 Wochen vor dem Abferkeln
2. Injektion → 4 Wochen später

Wiederholungsimpfungen → bei jeder Trächtigkeit eine Impfung, 2-4 Wochen vor dem Abferkeln

Impfstoff Clostricol:

Impfdosis: 4ml subkutan (unter die Haut)

1. Injektion → 5 Wochen vor dem Abferkeln
2. Injektion → 2-3 Wochen vor dem Abferkeln

Impfstoff: Porcilis ColiClos

Impfdosis: 2ml intramuskulär hinter dem Ohr

1. Injektion → 6-8 Wochen vor dem Abferkeln
2. Injektion → 4 Wochen später (Booster)

Wiederholungsimpfungen → eine Injektion, 3-4 Wochen vor dem Abferkeln

Clostridien

Impfstoff: Porcilis ColiClos

Impfdosis: 2ml intramuskulär hinter dem Ohr

1. Injektion → 6-8 Wochen vor dem Abferkeln
2. Injektion → 4 Wochen später (Booster)

Wiederholungsimpfungen → eine Injektion, 3-4 Wochen vor dem Abferkeln

Impfstoff: Clostricol

Impfdosis: 4ml subkutan (unter die Haut)

1. Injektion → 5 Wochen vor dem Abferkeln
2. Injektion → 2-3 Wochen vor dem Abferkeln

Lawsonien

Impfstoff: Enterisol Ileitis

Impfdosis: 2ml oral ab einem Alter von 3 Wochen (vor dem Absetzen!)

→ 3 Tage vor und nach der Impfung darf nicht mit Antibiotika behandelt werden!

Das Impfschema sollte für jeden Betrieb individuell angepasst werden.

👉 Es sollten nur gesunde Tiere geimpft werden!